



- Céréales** - Pucerons : Traitement toujours inutile. *Navy*  
- Désherbage de post-levée précoce.
- Colza** - Charançon du bourgeon terminal :  
Reprise du vol.  
- Baris : Captures.  
- Pucerons : Faible intensité.  
- Désherbage de post-levée.

## Céréales

Les orges les plus avancées commencent à taller, les blés étant encore au stade 3 feuilles.

### Pucerons

Les populations de pucerons sont généralement au même niveau que la semaine précédente. Il est donc inutile d'intervenir dans la plupart des situations.

Avec les froids qui reviennent, nous avons de fortes chances d'éviter tout traitement contre ce parasite cet automne. La surveillance devra cependant se poursuivre si les températures s'adoucissent à nouveau dans les prochaines semaines.

Les désherbages de post-levée précoces peuvent être réalisés dans de nombreuses situations, notamment dans les parcelles où les céréales sont au stade 3 feuilles et les graminées et les dicotylédones déjà levées.

Attention : Les écarts de températures importants ont plus d'influence que le temps froid sur la sélectivité de certains produits.

Nous rappelons que les adaptations de doses doivent être raisonnées parcelle par parcelle et tenir compte :

- du produit utilisé et de son

### Désherbage

efficacité sur la flore présente,

- du stade des adventices,
- des conditions extérieures au moment du traitement,
- de la précision du matériel utilisé.

En cas de doute, il est préférable de choisir la dose la plus forte. Une mauvaise efficacité coûte toujours plus cher que l'économie espérée d'une réduction de dose.

Enfin, les produits à action racinaire se prêtent mal à cette technique, la teneur en argile étant un frein important à toute diminution de quantité de matière active/ha.

7409

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
DIRECTION RÉGIONALE  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

**SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX**

38, rue Sainte-Catherine - 54043 NANCY CEDEX - Tél. : 83.30.41.51



# Colza

Les colzas atteignent le stade 6 - 8 feuilles.

## Charançon du bourgeon terminal

Suite aux températures douces, le vol a repris de façon intense sur le Plateau de Haye et la région de Vézelize (20 à 30 captures) durant le week-end du 15-16 octobre. Les températures douces sont favorables à l'activité de ces insectes, mais le

temps pluvieux devrait la ralentir. Surveiller attentivement vos cuvettes.

Les traitements arrivant en fin de rémanence (> 15 jours) devront être renouvelés si vous continuez à piéger des insectes.

## Baris

Ce gros charançon est aussi capturé dans les bacs jaunes. Les dégâts parfois observés en début de montaison sont occasionnés uniquement par les larves qui creusent des galeries dans le pivot. La nuisibilité de ce ravageur est très mal connue à l'heure actuelle.



Baris

## Pucerons

Le taux de pieds colonisés par les pucerons reste faible : de 0 à 15 % de pieds touchés en moyenne. Pas de traitement spécifique.

## Herbicides utilisables en post-levée

Matières actives	Spécialités commerciales (firmes)	Doses/ha	Observations
carbétamide	Légurame PM (RPA)	3 kg	- Depuis le stade 4 feuilles vraies du colza (B4) jusqu'à 3 semaines avant la reprise de végétation. - Application possible sur sol gelé. - <b>Essentiellement antigraminées. Action racinaire.</b>
		5 à 6 kg	- Contre chiendent de novembre à fin janvier.
propyzamide	Kerb Flo (Rohm et Haas)	1,25 l	- A partir du stade 3 feuilles vraies du colza (B3) jusqu'à la reprise de végétation. - Application sur sol gelé possible. - <b>Antigraminées + action sur véronique et stellaire. Action racinaire = indépendance par rapport aux conditions climatiques.</b>
propyzamide + diuron	Kerb Ultra (Rohm et Haas)	1,2 kg	- A partir du stade 4 feuilles bien développées sur des colzas sains, bien implantés. - De préférence avant l'hiver. - <b>Antigraminées et action limitante sur sanves, ravenelles. Action racinaire.</b> - A utiliser par temps humide, couvert et frais sur colza avec cuticule bien formée. - Ne pas mélanger avec un "antigraminées" à action foliaire.
carbétamide + diméfuron	Pradone TS (RPA)	3,5 kg	- A partir du stade 6 feuilles vraies (B6) des colzas sains et bien implantés jusqu'avant la reprise de végétation. - Application possible sur sol gelé. - Antidicotylédones et antigraminées. (bons résultats sur <b>alchémille, coquelicot, laitron, mouroin des champs, véronique feuille de lierre, véronique de Perse</b> ).
clopyralid	Lontrel SF 100 (Schéring)	1,2 l	- De la levée du colza jusqu'au stade boutons floraux (D1). - Antidicotylédone spécifique. - Spectre : composées, légumineuses et ombellifères. (Action intéressante sur <b>bleuet, chardon, lampsane, laitron</b> ). - S'emploie à la dose de 0,75 l à 1,25 l avec 3 l d'huile Schéring.
pyridate + piclorame	Chrono (Dow Elanco)	0,8 à 1,25 kg	- Antidicotylédones spécifique. <b>Bonne efficacité sur gaillet au printemps</b> - Préconisé en <b>rattrapage d'automne sur géranium rotundifolium et dissectum, alchémille, mâche, bleuet</b> à la dose de 0,8 kg/ha au stade B4 du colza 1 kg/ha au stade B5 du colza 1,25 kg/ha au stade B5-B6 du colza.
isoxaben	Cent 7 (Dow Elanco)	0,4 l	- Antidicotylédone spécifique. Intérêt sur <b>sanves et ravenelles (stade rosette)</b> - <b>Traiter de 6 à 7 feuilles vraies du colza.</b> - Attendre une gelée pour que le colza ait développé une cuticule cireuse. - Mélange fortement déconseillé.

N.B. Clerdone n'est plus commercialisé.